
Prilog 12.

Tipovi tla na području uzgoja *Čepinskog kupusa.*



- Aluvijalna (fluvisol)
- Aluvijalno livadno (humofluvisol)
- Černozem na praporu
- Černozem na praporu, semiglejni i tipini
- Eutrično smeđe
- Eutrično smeđe na praporu
- Gyttja (Gitja)
- Halomorfna
- Hidromeliorirano
- Kiselo smeđe na klastitima
- Kiselo smeđe na metamorfitima i klastitima
- Kiselo smeđe na praporu i holocenskim nanosima
- Lesivirano na praporu
- Lesivirano na praporu, semiglejno
- Lesivirano pseudoglejno na praporu
- Močvarno glejna
- Močvarno glejna, djelomično hidromeliorirana
- Močvarno glejno vertično
- Močvarno glejna, djelomično hidromeliorirana
- Močvarno glejno vertično
- Pseudoglej na zaravni
- Pseudoglej obronačni
- Pseudoglej-glej, djelomično hidromeliorirani
- Rendzina na laporu (flišu) ili mekim vapnencima
- Rigolano na praporu
- Ritska crnica vertična, djelomično hidromeliorirana
- Ritska crnica, djelomično hidromeliorirana
- Veća naselja
- Vodene površine (rijeke, jezera, ribnjaci)
- Černozem na praporu
- Černozem na praporu, semiglejni i tipični
- Eutrično smeđe
- Eutrično smeđe na praporu
- Kiselo smeđe na klastitima
- Kiselo smeđe na metamorfitima i klastitima
- Kiselo smeđe na praporu i holocenskim nanosima
- Močvarno glejna